



Шипохвостов рекомендуется содержать в просторных горизонтальных террариумах с толстым слоем мелкого гравия либо песка, чтобы шипохвостам его хватило для «полного погружения». Снизу грунт должен быть постоянно увлажненным. В тёплом углу следует поддерживать температуру 40-50 °С, а в прохладном - около 30 °С. Обязательно следует обеспечить суточный перепад температуры, чтобы ночью она не превышала 24 °С (но и не падала ниже 15-18 °С). Для освещения обязательно должны быть использованы ультрафиолетовые лампы. Основной рацион шипохвостов в неволе составляют различные овощи и фрукты, нарезанные на кусочки, листья травянистых растений, кормовые насекомые и новорожденные мышата. Для успешного развития шипохвостов им требуются добавки витаминно-кальциевых комплексов. Следует отметить, что разводить шипохвостов в неволе довольно сложно. Случаи размножения в террариуме возможны, только если самка была поймана в природе беременной. Ведь даже определение пола этого животного бывает довольно затруднительным, поскольку у самцов практически не видны припухлости у основания хвоста, а бедренные поры есть не у всех видов шипохвостов. Чтобы стимулировать спаривание, этим животным необходимо обеспечить продолжительную зимовку с температурой 13-15 °С. В такую зимовку шипохвостов следует вводить не менее трёх месяцев подряд, постепенно понижая температуру и уменьшая световой день. Сезон размножения начинается примерно в конце февраля и продолжается до начала апреля. За сезон у самки бывает несколько кладок, в каждой от 5 до 20 яиц. Откладывает она их во влажный субстрат, период инкубации зависит от вида, и длится в среднем 75-100 дней. Ювенальные особи в большинстве своем насекомоядны, им обязательно требуется содержание в УФ-спектре и введение витаминных добавок с витамином D3 и препаратами кальция.